



CHARANÇON DE L'IRIS DES MARAIS



27/08/2019 - **ROSALIA** - Coléoptères

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Ce très petit charançon de 4 mm est ovale trapu, comme tous les insectes de cette famille il a un appendice sur le devant de la tête appelé rostre qui porte les antennes.

Il est marron foncé à noir avec les élytres (dos) striés longitudinalement et portant en son milieu un gros point blanchâtre allongé.

Attention ne pas confondre avec d'autres charançons de même forme, mais ne possédant pas de point blanc.



Photo de Charançon de l'iris des marais par l'association Rosalia.

RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

Le Charançon de l'iris des marais est une espèce assez commune des milieux humides étangs et tourbières.

Elle est présente aux Chambarans, l'ENS de l'Herretang à St-Laurent-du-Pont, la Taillat à Meylan, RNR du Saugy à Brangues (bord du Rhône), etc.

ÉCOLOGIE LOCALE

La ponte a lieu en mai-juin dans les fleurs principalement de l'iris des marais (*Iris pseudacorus*).

Les larves se nourrissent de la graine et l'adulte s'y transforme à l'automne, il hiverne et ne sort qu'au printemps suivant.



PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

L'adulte est visible d'avril à juin sur les fleurs de diverses iris sauvages ou cultivées mais le plus souvent sur l'iris des marais dans les milieux humides du département.

ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

Préserver les milieux humides qui voient leurs surfaces diminuées.

Respecter ces milieux en évitant le piétinement, et ne pas ramasser pas les fleurs d'iris sauvages.

LIENS

- [Club Entomologique Dauphinois "Rosalia"](http://clubrosalia.free.fr/) (*http://clubrosalia.free.fr/*) [1]