# LE CHAMPIGNON DU MOIS DE SEPTEMBRE : AMANITA PHALLOÏDES (AMANITE PHALLOÏDE)

SMD38

**Description**

Chapeau: de 3 à 15 cm, de couleur variable, typiquement vert olive ou vert jaune, mais aussi brun-vert voire crème, (il existe même une variété blanche dite alba), toujours parcouru de fibrilles radiales brun-gris (comme dessinées avec un crayon à papier) à marge non striée.

**Remarque** : c'est la couleur variable du chapeau qui va entraîner le risque de nombreuses confusions signalées plus loin, et qui sont lourdes de conséquences du fait de la toxicité de l **'amanite phalloïde qui est mortelle**.

Lames : libres, blanches à reflets verdâtre, fines et serrées.

Pied : de 5 à 20 cm de haut, jusqu'à 2 cm de diamètre, droit, blanchâtre, chiné de zigzags jaunes verdâtres; avec un anneau membraneux, important en jupe, ample et strié, de couleur blanche, disparaissant parfois car mangé par les limaces; et se terminant par un bulbe enserré dans une volve en forme de sac, ample, blanche et devenant parfois verdâtre à l'intérieur.

Chair: blanchâtre, odeur nulle puis de rose fanée en vieillissant.

Habitat: feuillus, taillis argilo-calcaires, châtaigniers, charmes, chênes et aussi conifères, de juillet à novembre, avec de fortes poussées en septembre et octobre.

*Développement de l'amanite phalloïde en quelques jours :*

**Attention aux risques de confusion.**

*Amanita phalloïdes var alba* (Amanite phalloïde variété blanche) peut être confondue avec :

- Russula cyanoxantha variété peltereaui (Russule charbonnière variété verte) comestible
- Russula virescens (Russule verdoyante) comestible
- Tricholoma portentosum (Tricholome prétentieux) comestible
- Tricholoma auratum(Tricholome équestre) mortel
- Tricholoma sejunctum(Tricholome disjoint) à rejeter
- Amanita virosa (Amanite vireuse): Mortelle

- Leucoagaricus leucothites (Lépiote pudique) comestible mais à éviter du fait du risque de confusion trop facile avec les amanites blanches mortelles.
- Agaricus campestris (Rosé-des-prés) comestible

**INTOXICATION** : les intoxications les plus mortelles sont souvent dues à l'amanite phalloïde. Le foie est l'organe le plus touché par les toxines de ce champignon puis les reins.

Il n'y a pas de traitement possible, mais dans certains cas, on peut être amené à faire une greffe de foie.

*Photos : Claudine Vicherd/Jocelyne Sergent (Pharma-Nature, JJM)*

Source: Société Mycologique du Dauphiné

Consulter notre site: **https://www.smd38.fr/** *(https://www.smd38.fr/)* [1]