ORRHODIE LIGULÉE

31/05/2018 - FLAVIA - Papillons

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Envergure : 30 - 38 mm.

Ce papillon peut se présenter sous des couleurs différentes avec de nombreuses formes transitoires entre le brun clair, brun-gris, brun roux et le brun-noir. Le recto des ailes antérieures est légèrement recourbé ; traversé verticalement par une ligne ondulée ; point discal noir plus ou moins visible selon la couleur de fond et situé dans une bande mince, sombre et diffuse qui

traverse l'aile verticalement. Les ailes postérieures sont plutôt unicolores, gris foncé ou gris-brunâtre, avec un point discal peu visible.

L'espèce peut être confondue avec d'autres espèces visuellement très proches : Conistra vaccinii (Orrhodie de l'Airelle) et Conistra alicia (Orrhodie du Conflent).

RÉPARTITION DE L’ESPÈCE EN ISÈRE

Conistra ligula
Conistra ligula



Carte de l'Isère avec observations du papillon Orrhodie ligulée.

Extraction en 2018.

Source : BD Alti IGN, Faune isère, LPO isère

ÉCOLOGIE LOCALE

Cette espèce a une génération par an.

Ce sont les imagos (adulte au stade final après l'oeuf et la larve) qui passent l'hiver.

Ces derniers sont nocturnes, actifs surtout en début de nuit, ils s'arrêtent de voler lorsque les températures sont trop froides et ils se mettent en arrêt temporaire de développement.

Polyphages (régime alimentaire varié), les chenilles se nourrissent de plantes basses et des feuilles d'arbres et d'arbustes.

Ce papillon aime la chaleur (=thermophile), Conistra ligula s'observe dans les milieux préforestiers, les lisières et les boisements clairs, en particulier sur sol calcaire.

Espèce présente de l'étage collinéen à montagnard (1000 à 1700 mètres de dénivelé).

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

Les adultes peuvent être observés d'octobre à mai de l'année suivante.

ACTIONS FAVORABLES À L’ESPÈCE

...

COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

Cette fiche a été réalisée d’après :

Skou (Peder) & Sihvonen (Pasi), 2015. The Geometrid Moths of Europe, Subfamily Ennominae 1. Brill, Leiden. Volume 5, 657 pp.

Collectif d'entomologistes amateurs coordonné par Roland Robineau, 2007. Guide des papillons nocturnes de France. Ed. Delachaux & Niestlé. 288 pp.

LIENS

- **Fiche espèce de l'Orrhodie ligulée (INPN)** *(https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249627)* [1]
- **Liste rouge des papillons diurnes de Rhône Alpes** *(https://drive.google.com/drive/folders/12TS6EzDCZxVdCu60vGb82EokmuW0zFFp)* [2]
- **Site de l’association Flavia** *(http://www.flavia-ape.fr/)* [3]